

सोया कृषकों के लिए साप्ताहिक सलाह (2026)

Weekly Soybean Advisories for for Soybean Growers (2026)



फा.क्र./File No. टेक 10-6/2026

खरीफ 2026

File. No. Tech 10-6/2026/Weekly Soybean Advisory

Date: 13.07.2026

सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह / Weekly Advisory for Soybean Farmers (13-19 जुलाई 2026 / 13th to 19th July 2026)

- सोयाबीन की खेती किये जाने वाले क्षेत्रों में बोवनी लगभग संपन्न होने का अनुमान हैं. जिन कृषकों की बोवनी अभी तक संभव नहीं हुई, वे कृपया सोयाबीन के स्थान पर कम समयावधि वाली अन्य फसलों (मुंग, उड़द, मक्का) की बोवनी करें.
- वर्तमान में सोयाबीन की फसल ने लगभग 3 सप्ताह की अवधि पूर्ण किया है. ऐसी स्थिति में कीट/रोग/खरपतवार नियंत्रण के उपायों के साथ साथ अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही हैं.
- Majority of the farmers of the soybean-growing areas have completed the sowing by now. The remaining farmers are advised to grow alternative short-duration crops (such as Moong, Urd, or Maize) instead of soybean.
- Currently, soybean crop is of three weeks' duration. The farmers are advised to take up appropriate measures for the control of pests, diseases, and weeds.

1.	अधिक दिनों तक बारिश की अनुपस्थिति में कृषकों को सलाह है कि फसल में स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई या परंपरागत विधियों से सिंचाई करें. Farmers are requested to apply need based irrigation in case of long dry spell.	
2.	सूखे के दौरान लोह तत्व की अनुपलब्धता से सोयाबीन की उपरी पत्तियाँ पर पीलापन आ सकता है, जो वर्षा आने पर पूर्ववत हो सकेगा. अधिक तीव्रता होने पर 1% फेरस सल्फेट+0.2% चुना (प्रति लीटर पानी में 10 ग्राम फेरस सल्फेट + 2 ग्रा. चुना) मिलाकर फसल पर छिड़काव करें. Symptoms of interveinal chlorosis are seen on the upper leaves of soybean plants because of unavailability of iron during the dry spell experienced in certain areas (See Photo) which may disappear after the receipt of sufficient rains. If the intensity is high, farmers are advised to apply the foliar spray of $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ @ 10 g+2g $\text{Ca}(\text{OH})_2$ per litre of water.	
3.	जलभराव से होने वाले नुकसान से सोयाबीन फसल को बचाने हेतु कृषकों को सलाह है कि अतिरिक्त जल-निकासी सुनिश्चित करें. Farmers are advised to make necessary drainage arrangements to avoid waterlogging.	
4.	जहाँ भी संभव हो, खेत में खाली जगह/किनारों पर या बी.बी.एफ/रिज फरो पद्धति से बनी हुयी नालियों में कीट आकर्षक फसल (सुवा/गेंदा) की बोवनी करें. Farmers are advised to sow the seeds of Dill (Suva)/Transplant Marigold saplings in BBF furrows/wherever space is available. This will attract the defoliators facilitating insect control.	

5. जहाँ पर फसल 10-20 दिन की हो गई है, सलाह है कि खरपतवार नियंत्रण के उपाय जैसे हाथ से निर्दाई, डोरा/कुल्पा का प्रयोग या सोयाबीन फसल के लिए अनुशंसित खरपतवारनाशक (तालिका-1 में दी गयी सूची में से खड़ी फसल में उपयोगी किसी एक खरपतवार नाशक का छिड़काव करें. छिड़काव करते हुए पर्याप्त पानी की मात्रा का प्रयोग करें. खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवारनाशकों के प्रयोग हेतु फ्लड जेट या फ्लैट फेन नोजल उपयोग करें.	खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ 
For management of weeds, farmers are advised to follow weed control measures (inter-culture operations like manual weeding, dora/kulpa etc if feasible) or apply spray of any of the recommended Post-emergence herbicide after 10-15 days of sowing. The list of the recommended POE herbicides are given in Table 1. However they are advised to use adequate quantity of water (450-500 litre using knapsack sprayer and 120-150 litre using power sprayer) using specific Flood jet/Flat fan nozzle.	
6. इस समय तना मक्खी/सफेद मक्खी का प्रकोप प्रारंभ होने के सम्भावना होती है. अतः इसके नियंत्रण हेतु लक्षण दिखाई देने पर पूर्वमिश्रित कीटनाशक थायोमिथोक्सम 12.60%+लैम्ब्डा सायहलोथ्रिन 09.50% जेड.सी. (125 मिली./हे.) या बीटासायफ्लुथ्रिन+इमिडाक्लोप्रिड (350 मिली./हे.) या आइसोसायक्लोसरेम 9.2 WW.DC (10% W/V) DC (600 मिली./हे.) का छिड़काव करें.	
Initial infection of stem fly/white fly is likely to occur at this stage. Farmers are advised to control the same by spray of using spray of Thiamethoxam 12.60%+Lambda Cyhalothrin 09.50% ZC @125 ml/ha OR Betacyfluthrin + Imidacloprid @350 ml/ha OR Isocycloserum 9.2WW.DC (10% W/V)DV @600 ml/ha immediately after the symptoms are noticed.	
7. 15 दिन की सोयाबीन फसल में या नवजात पौधों में कॉलर रॉट या गरदनी सड़न और रायजोक्टोनिया जड़ सड़न नामक रोग का संक्रमण देखा जा रहा है. किसानों को सलाह है कि कृपया कार्बेन्डाजिम 50% (500 ग्राम/हेक्टेयर) का फसल पर छिड़काव करें. Wherever the crop is of 15-20 days duration, infection of color rat has been reported. Farmers are advised to apply the spray of Carbendazim 50% WP 0.1% if possible	

सामान्य सलाह / B.General advisory

क्या करें? What to do?	
1	सोयाबीन फसल पर पौध संरक्षण के लिए अनुशंसित रसायनों (खरपतवारनाशक/कीटनाशक/फफूंद नाशक) के छिड़काव में पर्याप्त पानी की मात्रा (नेप्टेक स्प्रेयर 450-500 लीटर/हे या ट्रेक्टर चालित पावर स्प्रेयर से 120-150 लीटर/हे न्यूनतम) का उपयोग करें. Farmers are advised to use recommended quantity of water while spraying the insecticide or herbicide (450-500 l/ha for knapsack/ tractor drawn sprayer OR 120-150 l/ha for power sprayer).
2	कीटनाशक के छिड़काव हेतु होलो कोन नोजल जबकि खरपतवारनाशक के छिड़काव हेतु फ्लड जेट/फ्लैट फेन नोजल का उपयोग करें. Farmers are advised to use hollow cone nozzle for spray of insecticide while flood jet/flat fan nozzle during the spray of herbicide in standing soybean crop.
3	किसी भी प्रकार का कृषि-आदान क्रय करते समय दूकानदार से हमेशा पक्का बिल लें जिस पर बैच नंबर एवं एक्सपायरी दिनांक स्पष्ट लिखा हो . While purchasing any Agri-input, always obtain a <i>pucca bill</i> from the shopkeeper showing batch number and expiry date of the product(s).
क्या नहीं करें? What not to do?	
1	ऐसे रसायन (कीटनाशक/खरपतवारनाशक/फफूंदनाशक) जो सोयाबीन फसल में उपयोग हेतु भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा जारी सूचि में शामिल नहीं, उपयोग नहीं करें.

	Do not use such chemicals (insecticide/herbicide/fungicide) which are not having label claim for soybean duly approved by the Central Insecticide Board of GOI.
2	जिन रसायनों (कीटनाशक/खरपतवारनाशक/फफूंदनाशक) के मिश्रित उपयोग की वैज्ञानिक अनुशंसा या पूर्व अनुभव नहीं है, ऐसे मिश्रण का उपयोग कदापि नहीं करें. इससे फसल को नुकसान हो सकता है. Farmers are suggested not to use any combination of insect/herbicides, which is not recommended/tested, by the ICAR-NSRI. This may cause damage/losses to the crop.
अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाये Preventive Measures	
1	पीला मोज़ेक रोग से सुरक्षा हेतु रोगवाहक कीट सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए अपने खेत में विभिन्न स्थानों पर पीला स्टिकी ट्रैप लगाएं. Install Yellow Sticky Traps at different locations in the field as preventive measures for control of white fly, a carrier for transmission of YMV disease.



तालिका 1: केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2026 को जारी सोयाबीन फसल में अनुशंसित खड़ी फसल में उपयोगी खपतवारनाशकों की सूची

खरपतवारनाशक का प्रकार	रासायनिक नाम	मात्रा/हेक्टे.
अ .बोवनी के 10-12 दिन बाद (POE)	क्लोरीम्यूरान इथाईल 25 डब्ल्यू.पी. +सर्फेक्टेन्ट	36 ग्राम
	बेन्टाझोन 48 एस.एल.	2.00 ली.
ब .बोवनी के 15-20 दिन बाद (POE)	क्लेथोडिम 13% w/w EC (क्लेथोडिम 12% w/v EC)	1000 ml
	इमेझेथापायर 10 एस.एल.	1.00 ली.
	इमेझेथापायर 70% डब्ल्यू.जी+सर्फेक्टेन्ट	100 ग्रा.
	क्विजालोफाफ इथाईल 5 ई.सी.	0.75-1.00 ली.
	क्विजालोफाफ-पी-इथाईल 10 ई.सी.	375-450 मि.ली.
	फेनाक्सीफाफ-पी- इथाईल 9.3 ई.सी.	1.11 ली.
	क्विजालोफाफ-पी-टेफ्युरिल 4.41 ई.सी.	0.75- 1.00 ली.
	फ्लूआजीफॉफ-पी-ब्युटाईल 13.4 ई.सी.	1.00-2.00 ली.
	हेलाक्सिफॉफ आर मिथाईल 10.5 ई.सी.	1.0-1.25 ली.
	प्रोपाक्विजाफॉफ 10 ई.सी.	0.50-0.75 ली.
	क्लेथोडियम 25 ई.सी.	0.50 -0.70 ली.
	फ्लूथियासेट मिथाईल 10.3 ई.सी.	125 मि.ली.
स .पूर्वमिश्रित खरपतवारनाशक (POE)	फोमेसाफेन 17.5% + क्लोडिनाफॉफ-प्रोपरगिल 12.5% w/w ME	1000 मि.ली.
	मेटासीफॉफ 8% + इमाजेथापायर 4% + इमाजामोक्स 3% डब्लू/डब्ल्यू एमई	1000 + अमोनियम सल्फेट @ 750 ग्राम/हेक्टेयर
	हेलोक्सीफॉफ आर मिथाईल एस्टर 16.5% + क्लोडिनाफॉफ प्रोपरगिल 8% ईसी	1000 मि.ली.
	फ्लूआजिआफॉफ-पी-ब्युटाईल+फोमेसाफेन	1.00 ली.
	इमाजेथापायर+इमेजामॉक्स	100 ग्रा.

प्रोपाक्विजाफॉप+इमाझेथापायर	2.00 ली.
फोमेसाफेन+ क्विजालोफाफ इथाईल	1.50 ली.
फोमेसाफेन 12.5% + क्विजालोफॉप इथाईल 4.68% ईसी	1.00 ली.
क्विजालोफाफ इथाईल + क्लोरीम्यूरान इथाईल+ सर्फेक्टेन्ट	375 मिली+36 ग्रा.+0.2%
फोमेसाफेन 12.5% + फेनाक्सीफाफ-पी- इथाईल 10% + क्लोरीम्यूरान इथाईल 0.9% ME (125 + 100 + 9 a.i./ha)	1.00 ली.
फ्लूथियासेट मिथाईल 2.5% + क्विजालोफाफ इथाईल 10% EC	0.50 ली.
क्विजालोफाफ इथाईल 7.5%+ इमाझेथापायर 15% w/w EC	0.50 ली.
फेनाक्सीफाफ-पी -इथाईल 6%+ क्लोरीम्यूरान इथाईल 0.9% + इमाझेथापायर 10% SC	1.00 ली.

Table 2. List of herbicides POE herbicides recommended for soybean (as per CIB lable claims 31.03.2026)

Application Timing	Chemical Name / Formulation	Dose per Hectare
Post-Emergence (PoE)		
10–12 Days after sowing	Chlorimuron Ethyl 25 WP + Surfactant	36 g
	Bentazone 48 SL	2.00 L
15–20 Days after sowing	Clethodim 13% w/w EC (12% w/v EC)	1000 ml
	Imazethapyr 10 SL	1.00 L
	Imazethapyr 70% WG + Surfactant	100 g
	Quizalofop Ethyl 5 EC	0.75–1.00 L
	Quizalofop-P-Ethyl 10 EC	375–450 ml
	Fenoxaprop-P-Ethyl 9.3 EC	1.11 L
	Quizalofop-P-Tefuryl 4.41 EC	0.75–1.00 L
	Fluazifop-P-Butyl 13.4 EC	1.00–2.00 L
	Haloxifop R Methyl 10.5 EC	1.0–1.25 L
	Propaquizafop 10 EC	0.50–0.75 L
	Clethodim 25 EC	0.50–0.70 L
	Fluthiacet Methyl 10.3 EC	125 ml
Pre-mixed Herbicides (PoE)	Fomesafen 17.5% + Clodinafop-propargyl 12.5% w/w ME	1000 ml
	Metamifop 8% + Imazethapyr 4% + Imazamox 3% W/W ME	1000 ml + 750g AS
	Haloxifop R Methyl Ester 16.5% + Clodinafop Propargyl 8% EC	1000 ml
	Fluazifop-P-Butyl + Fomesafen	1.00 L
	Imazethapyr + Imazamox	100 g

	Propaquizafop + Imazethapyr	2.00 L
	Fomesafen + Quizalofop Ethyl	1.50 L
	Fomesafen 12.5% + Quizalofop Ethyl 4.68% EC	1.00 L
	Quizalofop Ethyl + Chlorimuron Ethyl + Surfactant	375ml + 36g + 0.2%
	Fomesafen + Fenoxaprop-p-Ethyl + Chlorimuron Ethyl	1.00 L
	Fluthiacet Methyl + Quizalofop Ethyl (2.5% + 10% EC)	0.50 L
	Quizalofop Ethyl 7.5% + Imazethapyr 15% w/w EC	0.50 L
	Fenoxaprop-p-Ethyl 6% + Chlorimuron Ethyl 0.9% + Imazethapyr 10% SC	1.00 L
