

सोया कृषकों के लिए साप्ताहिक सलाह (2026)

Weekly Soybean Advisories for for Soybean Growers (2026)



फा.क्र./File No. टेक 10-6/2026

खरीफ 2026



File. No. Tech 10-6/2026/Weekly Soybean Advisory

Date: 03.08.2026

सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह / Weekly Advisory for Soybean Farmers (3-9 अगस्त 2026 / 3rd-9th August 2026)

अ. कीट नियंत्रण के उपाय A. Insect Control measures	
1.	चक्र भृंग के लक्षण दिखाई देने पर प्रारंभिक अवस्था में ही इसके नियंत्रण हेतु थायक्लोप्रिड 21.7 एस.सी. (750मिली/हे) या टेट्रानिलिप्रोल 18.18 एस.सी. (250-300 मिली/हे) या क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5 एस.सी 18.50 % SC (150 मिली/हे) या इमामेक्टीन बेन्जोएट (425 मिली /हे) या प्रोफेनोफॉस 50 ई.सी (1 ली./हे) का छिड़काव करें। यह भी सलाह दी जाती है कि इसके फैलाव की रोकथाम हेतु प्रारंभिक अवस्था में ही पौधे के ग्रसित भाग को तोड़कर नष्ट कर दें। For control of Girdle beetle, farmers are advised for destruction of affected plant/part as well as spraying of crop with Thiachloprid 21.7 S.C. (750 ml/ha) OR Tetraniliprole 18.18 SC (250-300 ml/ha) OR Chlorantraniliprole 18.50 % SC (150 ml/ha) OR Emamectin benzoate 01.90 % EC (425 ml/ha) OR Profenophos 50 E.C. (1 l/ha) soon after the symptoms are observed.
2.	बिहार हेयरी कैटरपिलर एवं टस्क मोथ का प्रकोप होने पर झुण्ड में रहने वाली इन इल्लियो को प्रारंभिक अवस्था में ही पौधे सहित खेत से निष्कासित करें एवं फसल पर फ्लूबेंडियामाइड 20WG (250-300 ग्रा/हे) या फ्लूबेंडियामाइड 39.35 SC (150 मिली/हे) या लैम्ब्डा सायहेलोथ्रिन 04.90 % CS (300 मिली/हे.) या इंडोक्साकार्ब 15.80 % EC (333 मिली/हे.) छिड़काव करें . In case of an attack of Bihar hairy caterpillar as well as Tusk Moth, farmers are advised to remove the affected plant and apply spray of Flubendiamide 20 WG (250-300 g/ha) OR Flubendiamide 39.35 SC (150 ml/ha) OR Lambda-cyhalothrin 04.90 % CS (300 ml/ha) OR Indoxacarb 15.80%EC (333 ml/ha).
3.	सोयाबीन फसल में तना मक्खी एवं सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु लक्षण दिखाई देने पर बाजार में उपलब्ध पूर्वमिश्रित कीटनाशक थायोमिथोक्सम 12.60%+लैम्ब्डा सायहेलोथ्रिन 09.50% जेड.सी. @125 मिली./हे. या पूर्वमिश्रित कीटनाशक बीटासायफ्लुथ्रिन+इमिडाक्लोप्रिड (350 मिली./हे.) या आइसोसायक्लोसरम 9.2 WW.DC (10% W/V) DC (600 मिली/हे.) का छिड़काव करें. In case of infestation of stem fly and white, farmers are advised to apply the spray of Thiamethoxam 12.60%+Lambda Cyhalothrin 09.50% ZC @125 ml/ha OR Betacyfluthrin + Imidacloprid @350 ml/ha OR Isocycloserum 9.2WW.DC (10% W/V) DV @600 ml/ha immediately after the symptoms are noticed.

4.	सेमीलूपर इल्ली के नियंत्रण हेतु निम्न में से किसी भी एक रसायन का छिड़काव करें : क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5 एस.सी, (150मि.ली./हे) या इमामेक्टिन बेंजोएट 01.90 (425 मि.ली./हे), या फ्लूबेंडियामाइड 20डब्ल्यू.जी (250-300 ग्राम/हे) या फ्लूबेंडियामाइड 39.35 एस.सी (150मि.ली.) या इंडोक्साकार्ब 15.8एस .सी (333 मि.ली/हे) , या लैम्बडा सायहेलोथ्रिन 04.90 सी. एस. (300 मिली/हे) या प्रोफेनोफॉस 50ई.सी.(1 ली/हे) या नोवाल्युरोन + इंडोक्साकार्ब 04.50 % एस. सी. (825-875 मिली/हे) या क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 09.30 % +लैम्बडा सायहेलोथ्रिन 04.60 % ZC, (200 मिली/हे) या ब्रोफ्लानिलाइड 300 g/l एस.सी. (42-62 ग्राम/हे), का छिड़काव करें.	
	For the control of Semilooper, farmers are advised to apply the spray of any of the following insecticide: Chlorantraniliprole 18.5 % SC (150 ml/ha) OR Emamectin benzoate 01.90 % EC (425 ml/ha) OR Flubendiamide 20 % WG (250-300 g/ha) OR Flubendiamide 39.35 % w/w SC (150 ml/ha) OR Indoxacarb 15.80 % EC (333 ml/ha), OR Lambda-cyhalothrin 04.90 % CS (300 ml/ha) OR Profenofos 50 % EC (1 l/ha) OR Novaluron+Indoxacarb 04.50% SC (825-875 ml/ha) OR Chlorantraniliprole 09.30 % + Lambda-cyhalothrin 04.60 % ZC (200 ml/ha) OR Broflanilide 300 g/l SC (42-62 g/ha).	
5.	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान द्वारा खरपतवारनाशकों एवं कीटनाशकों की सांगतता बाबत अभी तक किये गए अनुसन्धान परीक्षणों के अनुसार निम्न खरपतवारनाशक एवं कीटनाशकों की संगतता पाई गई हैं. अतः सलाह हैं कि जिन्होंने बोवनी पूर्व या बोवनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवारनाशकों का अभी तक प्रयोग नहीं किया है, निम्न सूचि में से कोई एक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक का मिलाकर छिड़काव किया जा सकता हैं. (1)कीटनाशक: क्लोरइंट्रानिलिप्रोल 18.5 एस.सी. (150 मिली/हे) या इन्डोक्साकार्ब 15.8 एस.सी (333 मि.ली./हे) (2) खरपतवारनाशक: इमाज़ेथापायर 10 एस.एल (1 ली/हे) या क्विज़ालोफोप इथाइल 5 ई.सी (1 ली/हे) As per the results of the trials conducted on compatibility of insecticides and herbicides at ICAR-NSRI, the combined use following insecticides and herbicides are found compatible. Farmers who did not apply PPI or PE herbicide are suggested to use combination of either one among the following insecticide and herbicides at this stage. (1) Insecticides: Chlorantraniliprole 18.5 SC (150 ml/ha) or Indoxacarb 15.8 EC (333 ml/ha) (2) Herbicides: Imazethapyr 10 SL (1 lit/ha) or Quizalofop ethyl 5 EC (1.00 lit/ha).	

ब. रोग प्रबंधन के उपाय B. Control measures for diseases		
1.	रायजोक्टोनिया एरिअल ब्लाइट रोग के लक्षण दिखाई देने पर सलाह हैं कि नियंत्रण हेतु अनुशंसित फफूंदनाशक फ्लुक्सापग्रोक्साड + पायरोक्लोस्ट्रोबीन (300 मिली/हे) या पायरोक्लोस्ट्रोबीन इपोकुसीकोनाजोल + (750 मिली/हे) का अपने फसल पर छिड़काव करें.	
2.	सोयाबीन फसल में कॉलर रॉट (गरदनी सड़न) नामक रोग का संक्रमण देखा जा रहा है. सलाह हैं कि इनके नियंत्रण हेतु कार्बेन्डाजिम 50% (500 ग्राम/हेक्टेयर) का फसल पर छिड़काव करें. Infection of collar rot is seen in soybean crop. Farmers are advised to apply the spray of Carbendazim 50% WP 0.1% if possible	

3. पीला मोज़ेक/सोयाबीन मोज़ेक रोग के लक्षण दिखने पर प्रारंभिक अवस्था में ही रोगग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर निष्कासित करें तथा इन रोगों को फैलाने वाले वाहक सफ़ेद मक्ख/एफिड की रोकथाम हेतु थायोमिथोक्सम + लैम्ब्डा सायहेलोथ्रिन (125मिली/हे) या बीटासायफ्लुथ्रिन+इमिडाक्लोप्रिड (350 मिली/हे) या एसिटेमीप्रीड 25%+बायफेंथ्रिन 25%WG (250ग्रा./हे) का छिड़काव करें. इनके छिड़काव से तना मक्खी का भी नियंत्रण किया जा सकता है .यह भी सलाह है कि सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु कृषकगणअपने खेत में विभिन्न स्थानों पर पीला स्टिकी ट्रैप लगाएं.	
For control of YMV/SMV diseases, farmers are advised to uproot/destroy the affected plant/parts along with spray with Alternatively, you may also use either one of the recommended pre-mixed insecticides like Thiamethoxam + Lambda Cyhalothrin (125 ml/ha) OR Betacyfluthrin + Imidacloprid (350 ml/ha) OR Acetamiprid 25% + Bifenthrin 25 % WG (250 g/ha). This will also facilitate control of stem fly. Farmers are also advised to use yellow sticky traps in order to attract white flies, the vectors of YMV/SMV respectively.	
4. एन्थ्राक्नोज रोग के प्रारंभिक लक्षण देखे जाने पर प्रारंभिक अवस्था में ही इसके नियंत्रण हेतु टेबूकोनाजोल 25.9 ई.सी. (625 मिली/हे) या टेबूकोनाजोल 38.39 एस.सी. (625 मिली/हे) या टेबूकोनाजोल 10%+सल्फर 65%WG (1.25 किग्रा./हे) या कार्बेन्डाजिम 12%+मेन्कोजेब 63% डब्ल्यू.पी. (1.25 किग्रा./हे) से फसल पर छिड़काव करें. In case of continued rains, infection of anthracnose disease is likely to occur. Farmers are advised to conduct surveillance of their crop at regular intervals and apply the spray of Tebuconazole 25.9 EC (625 ml/ha) OR 38.39 SC (625 ml/ha) OR Tebuconazole 10%+Sulphur 65% WG (1.25 kg/ha) OR Carbendazim 12%+Mencozeb 63% WP (1.25 kg/ha) immediately after the symptoms are seen.	 एन्थ्राक्नोज के लक्षण

स. सूखा प्रबंधन के उपाय C. Measures for Drought Management		
1.	सूखे की स्थिति / अधिक दिनों तक बारिश की अनुपस्थिति में कृषकों को निम्न उपाय अपनाने की सलाह हैं : 1. सोयाबीन फसल में फसल में डोरा/कुल्पा चलाकर निराई-गुड़ाई (Soil Mulch) करें. 2. डोरा करने के बाद, 15-25 दिन की फसल में 5 टन/हेक्टेयर की दर से फसल अवशेषों को बिछाकर मल्लिंग करें. 3. भूमी में दरारे पड़ने से पूर्व ही अनुसार स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई या परंपरागत विधियों से सिंचाई करें. 4. 20-25 दिन की फसल में थायोयूरिया (Thiourea) का 750 पीपीएम (750 मिग्रा/लीटर पानी) घोल बनाकर पर्णिय छिड़काव करें.	 
	Farmers are advised to adopt following measures in case of long dry spell. 1. Soil mulch with intercultural operations like Dora in a 15- 20-day-old crop 2. Crop residue mulch @ 5t/ha after dora/kulpa between 15-25 days old crop. 3. Apply need based irrigation before the development of soil cracks. 4. Spray of Thiourea @ 750PPM (750 mg/litre water) at 20 to 25 days old crop.	

2.	सूखे के दौरान लोह तत्व की अनुपलब्धता से सोयाबीन की उपरी पत्तियाँ पीली हो सकती हैं, जो वर्षा आने पर पूर्ववत् हो सकेगा. अधिक तीव्रता होने पर 1% फेरस सल्फेट+0.2% चुना (प्रति लीटर पानी में 10 ग्राम फेरस सल्फेट + 2 ग्रा. चुना) मिलाकर फसल पर छिड़काव करें. Symptoms of interveinal chlorosis can be seen on the upper leaves of soybean plants because of unavailability of iron during the dry spell (See Photo) which may disappear after the receipt of sufficient rains. If the intensity is high, farmers are advised to apply the foliar spray of $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ @ 10 g+2g $\text{Ca}(\text{OH})_2$ per liter of water.	
3.	अतिवर्षा की स्थिति में जलभराव से होने वाले नुकसान से फसल को बचाने हेतु जल-निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें. Farmers are advised to make necessary drainage arrangements to avoid waterlogging in case of continuous heavy rain.	

द. खरपतवार प्रबंधन के उपाय D. Weed Control measures

1.	कृषकों को सलाह है कि खरपतवार नियंत्रण हेतु सभी संभावित उपाय जैसे हाथ से निर्दाई, डोरा/कुल्पा का प्रयोग या सोयाबीन फसल के लिए अनुशंसित खरपतवारनाशक (तालिका-1 में दी गयी सूची में से खड़ी फसल में उपयोगी किसी एक खरपतवार नाशक का छिड़काव करें. छिड़काव करते हुए पर्याप्त पानी की मात्रा का प्रयोग करें. खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवारनाशकों के प्रयोग हेतु फ्लड जेट या फ्लैट फेन नोजल उपयोग करें.	खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ 
For management of weeds, farmers are advised to follow weed control measures (inter-culture operations like manual weeding, dora/kulpa etc if feasible) or apply spray of any of the recommended Post-emergence herbicide. The list of the recommended POE herbicides are given in Table 1. However they are advised to use adequate quantity of water (450-500 litre using knapsack sprayer and 120-150 litre using power sprayer) using specific Flood jet/Flat fan nozzle.		

सामान्य सलाह / General advisory

1.	बीजोत्पादन वाले खेत में शुद्धता बनाये रखने के लिए फूलों के रंग एवं पौधों/पत्तियों/तने पर पाए जाने वाले रोये के अधर पर भिन्न किस्मों के पौधों को अपने खेत से निष्कासित करें. Farmers are advised to carry out roughing (removal of off-type plants belonging to other varieties) in order to maintain seed purity. This can be done based in flower color or pubescence found on the plant/leaves/pods/stem.	
2.	अपने खेत की नियमित निगरानी करें एवं खेत में जाकर 3-4 स्थानों के पौधों को हिलाकर सुनिश्चित करें कि क्या आपके खेत में किसी इल्ली/कीट का प्रकोप हुआ है या नहीं और यदि हैं, तो कीड़ों की अवस्था क्या है? तदनुसार उनके नियंत्रण के उपाय अपनाये. Farmers are advised to monitor their crop on regular intervals preferably at 3-4 locations in their fields and see whether any insect/pest/caterpillar is there along with their stage. This will facilitate the effective insect control measures.	
3.	सोयाबीन की फसल में पक्षियों की बैठने हेतु "T" आकार के बर्ड-पर्चेस लगाये . इससे कीट-भक्षी पक्षियों द्वारा भी इल्लियों की संख्या कम करने में सहायता मिलती है . Farmers are also advised to install bird perches at different locations which facilitate seating arrangement for predatory bird which feed on leaf eating caterpillars.	

4.	सोयाबीन फसल पर पौध संरक्षण के लिए अनुशंसित रसायनों (खरपतवारनाशक/कीटनाशक/फफूंद नाशक) को अनुशंसित मात्रा में ही प्रयोग करें तथा छिड़काव में पर्याप्त पानी की मात्रा (नेप्सेक स्प्रेयर 450-500 लीटर/हे या ट्रेक्टर चालित पावर स्प्रेयर से 120-150 लीटर/हे न्यूनतम) का उपयोग करें. Farmers are advised to use recommended quantity of pesticides along and adequate water while spraying the pesticides (450-500 l/ha for knapsack/ tractor drawn sprayer OR 120-150 l/ha for power sprayer).	
5.	कीटनाशक के छिड़काव हेतु होलो कोन नोजल जबकि खरपतवारनाशक के छिड़काव हेतु फ्लड जेट/फ्लैट फेन नोजल का उपयोग करें. Farmers are advised to use hollow cone nozzle for spray of insecticide while flood jet/flat fan nozzle during the spray of herbicide in standing soybean crop.	
6.	किसी भी प्रकार का कृषि-आदान क्रय करते समय दूकानदार से हमेशा पक्का बिल लें जिस पर बैच नंबर एवं एक्सपायरी दिनांक स्पष्ट लिखा हो . While purchasing any Agri-input, always obtain a <i>pucca bill</i> from the shopkeeper showing batch number and expiry date of the product(s).	
7.	ऐसे रसायन (कीटनाशक/खरपतवारनाशक/फफूंदनाशक) जो सोयाबीन फसल में उपयोग हेतु भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा जारी सूचि में शामिल नहीं, उपयोग नहीं करें. Do not use such chemicals (insecticide/herbicide/fungicide) which are not having label claim for soybean duly approved by the Central Insecticide Board of GOI.	
8.	जिन रसायनों (कीटनाशक/खरपतवारनाशक/फफूंदनाशक) के मिश्रित उपयोग की वैज्ञानिक अनुशंसा या पूर्व अनुभव नहीं है, ऐसे मिश्रण का उपयोग कदापि नहीं करें. इससे फसल को नुकसान हो सकता है. Farmers are suggested not to use any combination of insect/herbicides, which is not recommended/tested, by the ICAR-NSRI. This may cause damage/losses to the crop.	

तालिका 1: केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2026 को जारी सोयाबीन फसल में अनुशंसित खड़ी फसल में उपयोगी खपतवारनाशकों की सूची

खरपतवारनाशक का प्रकार	रासायनिक नाम	मात्रा/हेक्टे.
अ .बोवनी के 10-12 दिन बाद (POE)	क्लोरीम्यूरान इथाईल 25 डब्ल्यू.पी. +सर्फेक्टेन्ट	36 ग्राम
	बेन्टाझोन 48 एस.एल.	2.00 ली.
ब .बोवनी के 15-20 दिन बाद (POE)	क्लेथोडिम 13% w/w EC (क्लेथोडिम 12% w/v EC)	1000 ml
	इमेझेथापायर 10 एस.एल.	1.00 ली.
	इमेझेथापायर 70% डब्ल्यू.जी+सर्फेक्टेन्ट	100 ग्रा.
	क्विजालोफाफ इथाईल 5 ई.सी.	0.75-1.00 ली.
	क्विजालोफाफ-पी-इथाईल 10 ई.सी.	375-450 मि.ली.
	फेनाक्सीफाफ-पी- इथाईल 9.3 ई.सी.	1.11 ली.
	क्विजालोफाफ-पी-टेफ्युरिल 4.41 ई.सी.	0.75- 1.00 ली.
	फ्ल्यूआजीफॉप-पी-ब्युटाईल 13.4 ई.सी.	1.00-2.00 ली.
	हेलाक्सिफॉप आर मिथाईल 10.5 ई.सी.	1.0-1.25 ली.

स .पूर्वमिश्रित खरपतवारनाशक (POE)	प्रोपाक्विजाफॉप 10 ई.सी.	0.50-0.75 ली.
	क्लेथोडियम 25 ई.सी.	0.50 -0.70 ली.
	फ्लूथियासेट मिथाईल 10.3 ई.सी.	125 मि.ली.
	फोमेसाफेन 17.5% + क्लोडिनाफॉप-प्रोपरगिल 12.5% w/w ME	1000 मि.ली.
	मेटामिफॉप 8% + इमाजेथापायर 4% + इमाजामोक्स 3% डब्लू/डब्ल्यू एमई	1000 + अमोनियम सल्फेट @ 750 ग्राम/हेक्टेयर
	हेलोक्सीफॉप आर मिथाईल एस्टर 16.5% + क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 8% ईसी	1000 मि.ली.
	फ्लूआजिआफॉप-पी-ब्युटाईल+फोमेसाफेन	1.00 ली.
	इमाजेथापायर+इमेजामॉक्स	100 ग्रा.
	प्रोपाक्विजाफॉप+इमाजेथापायर	2.00 ली.
	फोमेसाफेन 12.5% + क्लिजालोफॉप इथाईल 4.68% ईसी	1.00 ली.
	क्लिजालोफाफ इथाईल + क्लोरीम्यूरान इथाईल+ सर्फेक्टेन्ट	375 मिली+36 ग्रा.+0.2%
	फ्लूथियासेट मिथाईल 2.5% + क्लिजालोफाफ इथाईल 10% EC	0.50 ली.
	क्लिजालोफाफ इथाईल 7.5%+ इमाजेथापायर 15% w/w EC	0.50 ली.

Table 1. List of herbicides POE herbicides recommended for soybean (as per CIB lable claims 31.03.2026)

Application Timing	Chemical Name / Formulation	Dose per Hectare
10–12 Days after sowing	Chlorimuron Ethyl 25 WP + Surfactant	36 g
	Bentazone 48 SL	2.00 L
15–20 Days after sowing	Clethodim 13% w/w EC (12% w/v EC)	1000 ml
	Imazethapyr 10 SL	1.00 L
	Imazethapyr 70% WG + Surfactant	100 g
	Quizalofop Ethyl 5 EC	0.75–1.00 L
	Quizalofop-P-Ethyl 10 EC	375–450 ml
	Fenoxaprop-P-Ethyl 9.3 EC	1.11 L
	Quizalofop-P-Tefuryl 4.41 EC	0.75–1.00 L
	Fluazifop-P-Butyl 13.4 EC	1.00–2.00 L
	Haloxypop R Methyl 10.5 EC	1.0–1.25 L
	Propaquizafop 10 EC	0.50–0.75 L
	Clethodim 25 EC	0.50–0.70 L
	Fluthiacet Methyl 10.3 EC	125 ml
	Fomesafen 17.5% + Clodinafop-propargyl 12.5% w/w ME	1000 ml
	Metamifop 8% + Imazethapyr 4% + Imazamox 3% W/W ME	1000 ml + 750g AS

Pre-mixed Herbicides (PoE)	Haloxyfop R Methyl Ester 16.5% + Clodinafop Propargyl 8% EC	1000 ml
	Fluazifop-P-Butyl + Fomesafen	1.00 L
	Imazethapyr + Imazamox	100 g
	Propaquizafop + Imazethapyr	2.00 L
	Fomesafen 12.5% + Quizalofop Ethyl 4.68% EC	1.00 L
	Quizalofop Ethyl + Chlorimuron Ethyl + Surfactant	375ml + 36g + 0.2%
	Fluthiacet Methyl + Quizalofop Ethyl (2.5% + 10% EC)	0.50 L
	Quizalofop Ethyl 7.5% + Imazethapyr 15% w/w EC	0.50 L
